



NOMBRE	Brostart		
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno + Cobre + Manganeso + Zinc		
FORMULACION	Concentrado Soluble (SL)		
COMPOSICION		% p/v	% p/p
	Nitrógeno total (N)	5,8	5,2
	Cobre (Cu)	1,96	1,75
	Manganeso (Mn)	0,85	0,75
	Zinc (Zn)	0,56	0,5

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Brostart es un bioestimulante de uso foliar y vía riego, que activa el sistema inmunológico de la planta (SAR). Corresponde a una mezcla de extractos vegetales y nutrientes seleccionados, que aportan elicitores que ayudan a la planta a superar situaciones de estrés, decaimiento, susceptibilidad a enfermedades y condiciones ambientales adversas. Además, aumenta la actividad inmunológica de la planta frente a situaciones de estrés abiótico, tales como sequía, alta y baja temperatura, etc. Promueve una actividad equilibrada entre la parte aérea y radicular de las plantas, estimulando la fotosíntesis y el desarrollo vegetativo.

Brostart es muy estable, se absorbe rápidamente vía hojas, tallos y raíces, y es traslocado fácilmente por la planta, asegurando un movimiento acropétalo y basipétalo. Esto, lo hace especialmente indicado para los períodos de brotación y crecimiento de frutos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Cerezo Carozos (excepto ciruelo) Cítricos Kiwi Nogal Olivo Pomáceas Vid de mesa Vid vinífera	250 - 300	3 - 4	Aplicar desde brotación hasta postcosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos. Normalmente, se recomienda aplicar con brotes de 10 a 15 cm y repetir a los 7 días, con un mínimo de 2 aplicaciones. También se puede aplicar junto al ácido giberélico para crecimiento de bayas. Mojamiento: 1.000 - 1.500 L/ha de agua, según especie y estado fenológico.
Ciruelo Olivo	-	5 - 6	Aplicar vía riego, en momentos de mayor consumo energético, siempre en presencia de actividad radicular.

Cultivo	Dosis (cc/100L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Plantas en formación	250 - 300	-	Aplicar con buen mojado, cada 7 a 10 días. Excelente complemento a reguladores de crecimiento utilizados para la inducción de ramas laterales.
Berries	250 - 300	1,5 - 2,5	Aplicar desde brotación hasta post-cosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos.
Hortalizas	250 - 300	2 - 2,5	Aplicar desde trasplante a cosecha.

Nota: para aplicaciones vía riego utilizar 5 - 6 L/ha.

PRECAUCIONES

- Aplicar vía foliar asegurando una buena homogeneidad de la solución.
- Aplicar vía riego con sistemas tecnificados (goteros o microaspersores).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

- No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan y productos en base a zinc.
- Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones.